乙型鏈球菌是什麼？

乙型鏈球菌存在於我們周遭的生活環境中，常出現於女性泌尿系統及生殖系統內，

根據國內研究約18~20 %的孕婦產道帶有此細菌，新生兒可能會在生產過程中經由產道遭受感染。

大部分孕婦不會感到不適，但新生兒若受到感染，可能導致肺炎、腦膜炎、敗血症等併發症，對新生兒健康是相當大的威脅。



孕產婦關懷專線

0800-870870（0800抱緊您抱緊您）

- ○ 專人諮詢服務
- ○ 母乳哺育指導
- ○ 孕產資源與轉介
- ○ 心理調適與支持

孕產婦關懷網站

http://mammy.hpa.gov.tw

- ○ 孕產衛教知識
- ○ 孕程產檢管理
- ○ 孕產資源查詢
- ○ 就醫好幫手

守護健康
衛生福利部
國民健康署

衛生福利部 國民健康署 孕產婦關懷中心

關懷專線 0800-870870 (抱緊您 • 抱緊您)
週一至週五上午08:00-下午18:00
(例假日與國定假日休息)

關懷網站 mammy.hpa.gov.tw

雲端好孕守APP

Android

iOS

守護健康
衛生福利部
國民健康署

孕婦乙型鏈球菌篩檢

國民健康署 孕產婦關懷中心印製



乙型鏈球菌篩檢有補助嗎？

衛生福利部自101年4月15日起全面提供孕婦乙型鏈球菌篩檢每例500元的補助。
懷孕婦女至有服務合約的院所受檢皆可獲得補助。乙型鏈球菌特約醫療院所截至103年6月計有534家；其中400家不收差額。
欲進一步瞭解不另收差價醫療院所名單，可上國民健康署孕產婦關懷網站的乙型鏈球菌專區查詢：
http://mammy.hpa.gov.tw/GBS.htm

乙型鏈球菌有沒有疫苗？

目前並未有乙型鏈球菌的疫苗。
建議孕婦均需要接受乙型鏈球菌的篩檢，以確保孕產婦與新生兒的健康。





乙型鏈球菌如何檢查？

醫師利用棉棒擦拭陰道外口、會陰處及肛門口進行採檢，準媽媽們不會感到疼痛不適，也不會影響胎兒健康，經過一週的培養過程即可知道結果，建議準媽媽於懷孕35至37週期間進行乙型鏈球菌的培養篩檢。

乙型鏈球菌篩檢結果陽性怎麼辦？

不需緊張，醫師會於產前採取相關治療措施。

如果孕婦經篩檢檢驗確知為乙型鏈球菌陽性時，為了防止新生兒的乙型鏈球菌感染，醫師視情況會於門診時給予口服抗生素，並於陣痛時給予預防性的抗生素治療。

寶寶感染乙型鏈球菌會有什麼症狀？

並不是所有感染乙型鏈球菌的寶寶都會發病，受感染新生兒可能會有體溫過低、發燒、食慾減退、活動力不佳等狀況，較嚴重的會併發敗血症、肺炎、腦膜炎等問題。但乙型鏈球菌的感染也可能在出生數週或數月才出現延遲性感染，但是感染源則很難判斷是否為產婦。

剖腹產可以預防新生兒乙型鏈球菌感染嗎？

剖腹產不被用來預防新生兒的早發性乙型鏈球菌感染。乙型鏈球菌是很普遍的細菌，雖然篩檢呈陽性反應可能會感染新生兒，但是只要經過待產時的抗生素治療，感染機率會大幅降低，產婦不需要因為感染帶原而刻意採取剖腹方式生產。

守護健康
衛生福利部
國民健康署

衛生福利部 國民健康署 孕產婦關懷中心

關懷專線 0800-870870 (抱緊您 • 抱緊您)
關懷網站 mammy.hpa.gov.tw
雲端好孕守手機APP

Android　　iOS